

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ISSN : 0294 - 4693

DLP 10-3-83124917

Grandes cultures

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13, ROUTE DE LA FORET - BIAUD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58 39 02

ABONNEMENT ANNUEL 80 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN N° 23 (4/83) du 8 MARS 1983

CHARANCONS de la TIGE

COLZA

Un vol massif de charançons a été observé Jeudi 3 et Vendredi 4 Mars dans de nombreuses parcelles de la région : les captures en cuvette ont, en une seule journée, dépassées très souvent le seuil de 40 insectes. De tels vols n'avaient pas été observés dans notre région depuis 1974.

Depuis Vendredi, les captures sont beaucoup moins fortes : les insectes en sont maintenant à une phase de dissémination dans la parcelle.

Le meilleur critère pour décider d'un traitement est le comptage des pontes : le seuil est une moyenne d'une ponte par pied. Si cette observation n'est pas réalisable, s'en tenir aux captures en cuvettes jaunes : le seuil est alors de 40 captures cumulées en quelques jours.

Dans ces conditions, ne pas attendre pour traiter. Les produits vous ont été signalés dans le précédent bulletin.

TOUTES CULTURES

CAMPAGNOLS des CHAMPS

Les piègeages réalisés en Décembre et Janvier ainsi que les contrôles effectués fin Février, nous ont permis de préciser l'évolution des populations au cours de l'hiver.

Les populations sont généralement jeunes (50 à 80 % d'un âge inférieur à 60 jrs dans les secteurs suivants : St Anand-de-Boixe, Ruffec en Charente, Aiffres-Chizé, Brioux-Couture, Beauvoir-Coivert, Rom-Lezay en Deux-Sèvres, Chaunay - Gençay - Sauzé-Vaussais - Lusignan, Archigny dans la Vienne. Elles sont plus âgées dans les autres Secteurs de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres notamment Surgères, Aulnay, Usseau, Saint Agnant, Marans, Villiers-Echiré.

La reproduction s'est maintenue en Décembre 1982 et parfois en Janvier dans les Secteurs suivants :

Charente	:	Ruffec
Charente-Maritime	:	Surgères
Vienne et Deux-Sèvres	:	Secteur Sud Vienne Lezay Chaunay-Gençay, Brioux-Couture, Aiffres-Chizé, Thouars.

Les contrôles effectués en fin Février montrent que la reproduction s'est pratiquement arrêtée mi-Janvier et elle devrait ne reprendre qu'au mois de Mars vu les conditions météorologiques de Février.

Les risques de dégâts au printemps sont donc limités aux zones où les populations étaient très importantes.

P.I.B.

A. SECTEURS à RISQUES de DEGATS IMPORTANTS

Dans les secteurs suivants les densités de populations en Décembre-Janvier sont fortes à très fortes et laisse prévoir des risques de dégâts au printemps. Généralement ces populations étaient concentrées dans les refuges, les prairies naturelles ou artificielles, les chaumes, les bermes, aussi indiquons nous les zones où des pénétrations dans les jeunes semis ont été constatées.

Les Communes citées ci-dessous sont celles où des piègeages ont effectivement été réalisés, aussi est-il nécessaire de surveiller également les Communes avoisinantes où le comportement des campagnols est analogue.

DEUX-SEVRES

Secteur de THOUARS-AIRVAULT

Assais/Les Jumeaux, Borcq, Airvault, Irais, Noize, Missé, Pas de Jeu, Oiron, Orbé, St Generoux. Peu de pénétration dans les céréales et colza grain.

Secteur de LEZAY-CHAUNAY en particulier dans les groies

Pers, Ste Soline, Rom, Verrines, Linazay, Champagné-le-Sec, Chaunay, Blanzay

Vienne

Secteurs de LUSIGNAN - COUHE - CHAUNAY - GENCAY et SUD de la VIENNE :

Zones de groies

Notamment dans les zones de Linazay, Blanzay, Chaunay, Limalonges, Vanzay, Brux, St Pierre d'Exideuil. Dans ce secteur quelques pénétrations dans les céréales ont été constatés.

Dans les terres rouges le danger est nettement plus faible mais certaines prairies sont également à surveiller notamment à St Sauvant.

Secteur d'ARCHIGNY - LEIGNE - MONTHOIRON

Densité très élevées dans tous les milieux même dans les céréales, colza et jeunes semis de Ray-grass, à Monthoiron, Archigny, Chenevelles et Leigné-les-Bois.

CHARENTE

Secteur de RUFFEC

Salles de Villefagnan, Verteuil, Bayers, Chesson, Chenon, Lonnes.

Peu de pénétration dans les céréales en Janvier.

Dans tous ces secteurs le danger de pullulations au printemps est important. Aussi est-il nécessaire de surveiller attentivement les prairies artificielles ou naturelles, les chaumes subsistantes, les friches et bermes, les céréales, les colzas et d'intervenir rapidement notamment dans les secteurs d'Archigny, de Ruffec, et dans les groies Sud-Vienne.- Deux-Sèvres et à Thouars Airvault.

B. SECTEURS à RISQUES DE DEGATS LIMITES

Dans ces zones, les populations sont moins importantes et parfois faibles et limitées à certains milieux: friches, luzernes, trèfles ou vieux prés.

Les Communes à surveiller plus particulièrement sont les suivantes :

DEUX-SEVRES

Secteur de BRIOUX-COUTURE

Loubigné, Asnière-en-Poitou, Ensigné, Crézières, Aubigné, Loubillé.

Secteur AIFRES-CHIZE

St Médard, Ste Blandine; danger limité aux chaumes, luzernes et à leurs abords.

CHARENTE-MARITIME

Secteur de SURGERES

où la population est bien dispersée dans tous les milieux.

Secteur d'AULNAY

dans la zone de NERE-CHIVES

Dans tous ces secteurs il est nécessaire de surveiller attentivement les refuges, bermes, friches, prairies naturelles ou artificielles et d'intervenir s'il y a lieu.

C. SECTEURS à RISQUES FAIBLES

CHARENTE-MARITIME

Saint Agnant
Marans
Marans

DEUX-SEVRES

Villiers-Echiré
Beauvoir-Coivert
Usseau

Risques faibles , mais surveillance nécessaire des refuges : bermes, prés, prairies artificielles.

Imprimé à la Station le 8 Mars 1983

Précédente Note : Bulletin N° 22 du 24.2.83

77